Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Fluorouracil/Opus 50 mg/ml διάλυμα για ένεση ή έγχυση Φθοριουρακίλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
- Αυτό το φάρμακο συνταγογραφήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.
- Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Fluorouracil/Opus και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Fluorouracil/Opus
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Fluorouracil/Opus και ποια είναι η χρήση του

Το όνομα του φαρμάκου σας είναι «Fluorouracil/Opus 50 mg / ml, διάλυμα για ένεση ή έγχυση», αλλά στο υπόλοιπο του φυλλαδίου που θα ονομάζεται «Fluorouracil/Opus».

Τι είναι το Fluorouracil/Opus

Το Fluorouracil/Opus περιέχει το δραστικό συστατικό φθοριουρακίλη. Είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο.

Ποια είναι η χρήση του Fluorouracil/Opus

Το Fluorouracil/Opus χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών συνηθισμένων τύπων καρκίνου και ειδικότερα καρκίνου που παρέχει ενάρτυο, του οισοφάγου, του παγκρέατος, του στομάχου, της καρωτίδας και του τραχήλου, καθώς και του στήθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και ακτινοθεραπεία.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus

Μη χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη φθοριουρακίλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Fluorouracil/Opus (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
- εάν πάσχετε από σοβαρές λοιμώξεις (π.χ. έρπητα ζωστήρα, ανεμοβλογιά)
- εάν ο όγκος σας δεν είναι κακοήθης
- εάν έχετε εξασθενίσει πολύ λόγω μακρόχρονης ασθένειας
- εάν υπάρχει ενδοιασμός των σας έχει υποστεί βλάβη από άλλες θεραπείες (συμπεριλαμβανομένης της ακτινοθεραπείας)
- εάν τώρα λαμβάνετε θεραπεία ή έχετε λάβει θεραπεία τις τελευταίες 4 εβδομάδες με βρβιοδίνη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο, ως μέρος της θεραπείας για τον έρπητα ζωστήρα (ανεμοβλογιά ή έρπητας),
- εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε
- εάν πάσχετε από σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας
- σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι δεν έχετε καθόλου δραστηριότητα του ενζύμου αφυδρογονάση της διϋδροπυριμιδίνης (DPD) (έλλειψη έλλειψη DPD).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας, προτού χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Fluorouracil/Opus:
- εάν ο αριθμός των κυττάρων στο αίμα σας μειωθεί πολύ (θα υποβληθείτε σε αιματολογικές εξετάσεις για να ελεγχθεί αυτό)
- εάν έχετε εξέλκωση στο στόμα, πορεία η αμοιχρησία σε οποιοδήποτε βαθμό ή αδυναμία (αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται να είναι συνέπειες του πολύ χαμηλού αριθμού κυττάρων στο αίμα σας)
- εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με τα νεφρά σας
- εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με το ήπαρ σας συμπεριλαμβανομένου του ίκτερου (κιτρινίσματος του δέρματος)
- εάν έχετε προβλήματα με την καρδιά σας. Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν εμφανίσετε πόνο στο στήθος κατά τη διάρκεια της θεραπείας
- επιλέξει μερική έλλειψη δραστηριότητας μου εξόχων αφυδρογονάση της διϋδροπυριμιδίνης (DPD),
- εάν έχετε κάποιο μέλος της οικογένειας με μερική ή πλήρη έλλειψη του ενζύμου αφυδρογονάση της διϋδροπυριμιδίνης (DPD)
- εάν έχετε λάβει υψηλή δόση ακτινοβολίας στην περιοχή της λεκάνης
- εάν παρουσιάζετε ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού (στοματίτιδα, διάρροια, αιμορραγία από το γαστρεντερικό) ή αιμορραγία σε οποιαδήποτε θέση

Έλλειψη της DPD: Η έλλειψη της DPD είναι μια γενετική πάθηση που δεν σχετίζεται συνήθως με προβλήματα υγείας, εκτός εάν λαμβάνετε ορισμένα φάρμακα. Εάν έχετε έλλειψη της DPD και παίρνετε το Fluorouracil/Opus, διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών βαριάς μορφής (αναφέρονται στην παράγραφο 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες). Συναντάται η εξέταση σας για την έλλειψη της DPD πριν από την έναρξη της θεραπείας. Εάν δεν έχετε καθόλου δραστηριότητα του ενζύμου, δεν θα πρέπει να πάρετε το Fluorouracil/Opus. Εάν έχετε μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου (μερική έλλειψη), ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει μειωμένη δόση. Εάν έχετε αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για έλλειψη DPD, εξακολουθεί να είναι δυνατό να παρουσιαστούν βαριές μορφές και απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες.

Επικοινωνήστε αμέσως με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί, εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα: νέα έναρξη σύγχυσης, απορρυθμιστικολισμού ή άλλης μεταβολής της νοητικής κατάστασης, δυσκολίας με την ισορροπία ή τον προσανατολισμό, οπτικών διαταραχών. Αυτά θα μπορούσαν να είναι σημάδια εγκεφαλοπάθειας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κώμα και θάνατο, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία.

Άλλα φάρμακα και Fluorouracil/Opus

Πριν αρχίσετε τη θεραπεία, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η μίγμα περισσότερων του ενός φαρμάκων μπορεί να ενισχύσει ή να εξασθενήσει τη δράση των φαρμάκων.

Δεν πρέπει να λαμβάνετε βρβιοδίνη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο για τη θεραπεία του έρπητα ή της ανεμοβλογιάς) ταυτόχρονα με θεραπεία με φθοριουρακίλη (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιόδων διακοπής, όταν δε λαμβάνετε φθοριουρακίλη).

Εάν έχετε λάβει βρβιοδίνη θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή της βρβιοδίνης, πριν από την έναρξη της θεραπείας με φθοριουρακίλη. Βλέπε επίσης παράγραφο «Μην χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus».

Επιπλέον, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:
- Μεθοτρεξάτη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο)
- Μετρονιδαζόλη (ένα αντιβιοτικό)
- Λεβαμισόλιο λευκοβορίνη (ονομαζόμενη επίσης φυλλινικό ασβέστιο - χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιβλαβών δράσεων των αντικαρκινικών φαρμάκων)
- Αλλοπουρινόλη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συχνής αρθρίτιδας)
- Σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των στομαχικών ελκών)
- Βαφαρφαρίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των θρόμβων αίματος)
- Ιντερφερόνη άλφα-2α,
- Σισπλατίνη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο)
- Φαινυτοΐνη (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της επιληψίας/των κρίσεων και του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού)
- Εμβόλια
- Βινοκριβλίνη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο)
- Κυκλοφωσφαμίδη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο)
- Λεβαμιζόλη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοίμωξης από σκώληκες)
- Ταμοξιφαιήνη (ένα αντικαρκινικό φάρμακο)

Τα παραπάνω φάρμακα επηρεάζουν τη δράση της φθοριουρακίλης.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Η φθοριουρακίλη αντενδείκνυται σε συνταγές που είναι έγκυος ή θηλάζουν. Δεν πρέπει να πάρετε αυτό το φάρμακο, εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί. Εάν είστε γυναίκα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιείτε μια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά το διάστημα που θα παίρνετε αυτό το φάρμακο και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά. Εάν προκύψει εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας και να λάβετε γενετική συμβουλευτική.

Κάθος δεν είναι γνωστό εάν η φθοριουρακίλη απελευθερώνεται στο μητρικό γάλα, ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται εάν η μητέρα λαμβάνει Fluorouracil/Opus.

Εάν είστε άνδρας, θα πρέπει να απορρίψετε να τεκνοποιήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Fluorouracil/Opus και έως και 6 μήνες μετά τη διακοπή της. Σας συνιστάται να επιδιώξετε την διατήρηση σπέρματος πριν από τη θεραπεία, λόγω της πιθανότητας μη-αναστρέψιμης στειρότητας εξαιτίας της θεραπείας με Fluorouracil/Opus.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας, πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε μηχανές, καθώς η φθοριουρακίλη ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία και έμετο. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμβάντα στο νευρικό σας σύστημα και μεταβολές στην όραση. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες, μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε εργαλεία ή μηχανές, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές.

Το Fluorouracil/Opus περιέχει νάτριο

Fluorouracil/Opus περιέχει 7,78 mmol (178,2 mg) νατρίου ανά μέγιστη ημερήσια δόση (600 mg/m²). Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με ελεγχόμενη πρόσληψη νατρίου.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Fluorouracil/Opus

Η δόση φαρμάκου που θα σας χορηγηθεί θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας σας, το σωματικό σας βάρος, εάν έχετε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και το πόσο καλά λειτουργούν το ήπαρ και οι νεφροί σας. Θα εξαρτηθεί επίσης από τα αποτελέσματα των αιματολογικών σας εξετάσεων. Ο πρώτος κύκλος θεραπείας σας ενδέχεται να χορηγηθεί καθημερινά σε διαστήματα μίας εβδομάδας. Περαιτέρω κύκλοι ενδέχεται να χορηγηθούν ανάλογα με την ανταπόκρισή σας στη θεραπεία. Ενδέχεται επίσης να λάβετε θεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία.

Το φάρμακο ενδέχεται να αραιωθεί με διάλυμα γλυκόζης, διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή ίδιαρ για ενόσω πριν χορηγηθεί σε σας. Θα σας χορηγηθεί σε μια φλέβα είτε ως κανονική ένεση είτε ως μέρη ένεση μέσω εντάλαξης (έγχυση).

Εάν σας χορηγηθεί μεγαλύτερη δόση Fluorouracil/Opus από την κανονική

Καθώς το φάρμακο αυτό θα σας χορηγηθεί κατά την παρακονή σας στο νοσοκομείο, δεν είναι πιθανό να σας δοθεί λιγότερο ή περισσότερο από όσο πρέπει, ωστόσο, ενημερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας, εάν έχετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς.

Θα χρειαστεί να υποβληθείτε σε αιματολογικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Fluorouracil/Opus και μετά το τέλος της, προκειμένου να ελεγχθούν τα επίπεδα των κυττάρων στο αίμα σας. Η θεραπεία ενδέχεται να πρέπει να διακοπεί, εάν το επίπεδο των λευκών αιμοσφαιρίων μειωθεί πολύ.

Εάν λάβετε υπερβολική μεγάλη δόση φθοριουρακίλης, ενδέχεται να παρουσιαστεί ναυτία, έμετος, διάρροια, σοβαρή βλεννογονίτιδα και εξέλκωση του γαστρεντερικού, και αιμορραγία. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως:
- σοβαρή αλλεργική αντίδραση – ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα αιφνίδιο κνησμώδες εξάνθημα (πομφοί), πρήξιμο των χεριών, των ποδιών, των αστραγάλων, του προσώπου, των χειλιών, του στόματος ή του λαιμού (που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή), και ενδέχεται να αισθανθείτε ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε.
- πόνοι στο στήθος
- τα κόκκινα σας αιμοσφαίρια αίμα ή είναι μαύρα
- το στόμα σας είναι ερεθισμένο ή ανιαπτύσσει έλκη
- μυόδυσπνοια, μαρμαρύγματα ή τρόμοιδο στα χέρια ή στα πόδια
- επιτάχυνση του καρδιακού σας ρυθμού και δόσπνοια
- αίσθηση σύγχυσης ή αίσθηση αστάθειας στα πόδια σας, προβλήματα συντονισμού στα άνω και κάτω άκρα, δυσκολίες στη σκέψη/ομιλία, προβλήματα όρασης/μνήμης
- Εάν παρουσιαστεί βαριάς μορφής στοματίτιδα (έλκη στο στόμα ή/και στον φάρυγγα), φλεγμονή του βλεννογόνου, διάρροια, σοβαρεπαρενία (αισζήμενος κίνδυνος λοιμώξεων) ή νευροτοξικότητα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου της θεραπείας, μπορεί να εμπλέκεται κάποια έλλειψη της DPD (ανατρέξτε στην παράγραφο 2: Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις).

Αυτές είναι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ενδέχεται να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Πολύ συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς

• Ιστρημικές ανωμαλίες του ΗΚΓ τος (ανεπαρκής παροχή αίματος σε ένα όργανο, συνήθως λόγω μιας απορρυχημένης αρτηρίας)	• Ουδετεροπενία (μη-φυσιολογικά χαμηλό επίπεδο ουδετερόφιλων στο αίμα)	• Λευκοπενία (μη-φυσιολογικά χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων στο κυκλοφορούν αίμα)
• Ανομία (κατάσταση στην οποία η μάζα των κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων είναι ανεπαρκής)	• Πανκυτταροπενία (μια διαταραχή στην οποία ο μυελός των οστών μειώνει σημαντικά ή σταματάει την παραγωγή αιμοσφαιρίων)	• Μείωση της παραγωγής αιμοσφαιρίων
• Υψηλός πυρετός και απότομη πτώση των κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων	• Φλεγμονή της επιφάνειας του στόματος και της πεπτικής οδού	• Φαρυγγίτιδα (φλεγμονή των βλεννογόνων μεμβρανών που καλύπτουν τον λαιμό)
• Φλεγμονή του ορθού ή του πρωκτού	• Απώλεια όρεξης	• Υδαρής διάρροια
• Ναυτία	• Έμετος	• Τριχόπτωση (ιδιαίτερα στις γυναίκες)
• Καθυστερημένη εποζίλωση τραυμάτων	• Ρινική αιμορραγία	• Σύνδρομο χειρός-ποδός (μια τοξική δερματική αντίδραση)
• Γενική αδυναμία	• Κούραση	• Κόπωση
• Φλεγμονή του βλεννογόνου του στόματος	• Φλεγμονή του οισοφάγου	• Αίσθημα κακουχίας
• Λύζηση του ουρικού οξέος στο αίμα	• Λοιμώξεις	

Συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 10 ασθενείς
- Σταθηξη (σοβαρός πόνος στον θώρακα που σχετίζεται με αναπαρχή παροχή αίματος προς την καρδιά)
- Χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων που συνοδεύεται από πυρετό

Όχι συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 100 ασθενείς

• Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός	• Καρδιακή προσβολή	• Μυοκαρδιακή ισχαιμία (έλλειψη οξυγόνου στον καρδιακό μυ)
• Μυοκαρδίτιδα (φλεγμονώδης νόσος του καρδιακού μυ)	• Καρδιακή ανεπάρκεια	• Διαστολική μυοκαρδιοπάθεια (ένας τύπος καρδιακής νόσου, στην οποία ο καρδιακός μυς είναι μη-φυσιολογικά μεγεθυμένος, πεπιεσμένος ή/και σκληρυμένος)
• Καρδιομυϊκός οσκ	• Χαμηλή αρτηριακή πίεση	• Υπνηλία
• Αφυδάτωση	• Βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα ή τους ιστούς του σώματος	• Εξέλκωση του γαστρεντερικού και αιμορραγία, ξηρόδυσθαι του δέρματος
• Ρυθμικές κινήσεις των ματιών	• Κεφαλαλγία	• Αισθήσεις αναισθησίας και αστάθειας
• Συματώματα της νόσου του Πάρκινσον (μια προοδευτική νευρική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τρέμουλο, δυσκαμψία, αργής κινήσεις)	• Πυρομαδικά σημεία	• Αίσθηση αδιαθεσίας

• Φλεγμονή του δέρματος	• Δερματικές αλλοιώσεις όπως ξηρό δέρμα, ραγίες (εκσκαπάνη), απώλεια δέρματος (διάβρωση), αγριδότητα, κνησμώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (εξάνθημα που ξεκινάει στα κάτω άκρα και κατόπιν μεταδίδεται στα άνω άκρα και στο στήθος)	• Δερματικό εξάνθημα που συνοδεύει ορισμένες λοιμώδεις ασθένειες
• Εμφάνιση κνησμωδών, σημαδιών στο δέρμα	• Ευαισθησία στον ήλιο (φωτοευαισθησία)	• Σκούρος χρωματισμός του δέρματος (υπερμελάγχρωση)
• Ανομοιόμορφος σκούρος (υπερμελάγχρωση) ή φωτεινός (αποχρωματισμός) χρωματισμός του δέρματος κοντά στις φλέβες	• Μεταβολές στα νύχια (π.χ. διάχυτη επιφανειακή κνανή χρώση, σκούρος χρωματισμός (υπερμελάγχρωση), θυστροφή ονύχων, πόνος και πάχυνση της κοίτης του νυχιού.	• Παρωνυχία (φλεγμονή του ιστού που περιβάλλει ένα νύχι)
• Φλεγμονή της μύτης του νυχιού με σχηματισμό πύου και απώτωση του νυχιού	• Διαταραχή της παραγωγής σπέρματος ή ωαρίων	• Βλάβη των ηπατικών κυττάρων
• Έκκριση δακρύων	• Θολή όραση	• Φλεγμονή ή ερυθρότητα της επιφάνειας του λευκού μέρους του ματιού και στην κάτω πλευρά του βλεφάρου
• Κινητική διαταραχή των ματιών	• Οπτική νευρίτιδα (διαταραχή της όρασης που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του οπτικού νεύρου)	• Διπλή όραση
• Μείωση της οξύτητας της όρασης	• Εκτεταμένη εικαισθησία στο φως και αυστηρική για το φως του ήλιου ή τα έντονα φωτισμένα μέρη	• Ορθοκλωκή νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή του χεύλους των βλεφάρων
• Στρέβη του κάτω βλεφάρου προς τα έξω	• Απόφραξη των δακρυϊκών πόρων	• Διευρυσμούς ενός στρόωματος η μίζης νεκρού ιστού από τον περιβάλλοντα ζωντανό ιστό, όπως σε ένα τραύμα, ένα έλκος ή μια φλεγμονή
• Ευφορία		

Σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 1.000 ασθενείς

• Ανεπαρκής ροή αίματος στον εγκέφαλο, το έντερο και περιφερικά όργανα	• Αποχρωματισμός των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών και ορισμένες φορές άλλων περιοχών	• Γενικευμένη αλλεργική αντίδραση
• Οίδημα (φλεγμονή) μιας φλέβας προκαλούμενο από έναν θρόμβο αίματος	• Σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε όλο το σώμα (αναφυλαξία)	• Ανάπτυξη θρόμβου στα αιμοφόρα αγγεία. Μπορεί να συμβεί σε αρτηρίες ή φλέβες
• Συστηματική αγγειοδιαστολή (διαστολή των αιμοφόρων αγγείων) που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή αρτηριακή πίεση	• Αναπτύχθηκη κατάσταση σύγχυσης μπορεί να εμφανιστεί	• Απόζευη της θυρεοειδικές ορμόνες - Τ4 (θυροξίνη), Τ3 (τριιωδοθυρονίνη)

Πολύ σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 10.000 ασθενείς

• Καρδιακή ανακοπή (ανορνίθια διακοπή του καρδιακού παλμού και της καρδιακής λειτουργίας)	• Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (μη-αναμενόμενος θάνατος λόγω καρδιακών προβλημάτων)	• Σωματώματα λευκοκερκοφαλοπάθειας (ασθένειας που επηρεάζει τη λευκή ουσία του εγκεφάλου) σημαδεμένη με απώλεια της ικανότητας συντονισμού των κινήσεων των μυών)
• Οζώ παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο	• Δυσκολία στην καθαρή προφορά λέξεων	• Σύγχυση
• Νοητική σύγχυση ή διαταραχημένη συνείδηση, ειδικά αναφορικά με τον χρόνο, τον τόπο ή την ταυτότητα	• Μερική ή ολική απώλεια της ικανότητας προφορικής επικοινωνίας ή χρησης γραπτού λόγου	• Μη-φυσιολογική μείωη αδυναμία ή κόπωση
• Σπασμοί ή κώμα σε ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις φθοριουρακίλης και σε ασθενείς με ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της διϋδροπυριμιδίνης.	• Νευρική ανεπάρκεια	• Βλάβη των ηπατικών κυττάρων (περιπατώδες με θανατηφόρο έκβαση)
• Φλεγμονή της χοληδόχου κύστης	• Αρτή προοδευτική καταστροφή των μικρών χοληφόρων πόρων	• Αποφρακτικός

Μη-γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):
- Πυρετός
- Μούδιασμα ή αδυναμία των άνω και κάτω άκρων
- Αποχρωματισμός των φλεβών πλησίον των θέσεων ένεσης
- Τερηχαρδία, δύσπνοια
- Υπερευαισθησιακή εγκεφαλοπάθεια (δυσλειτουργία του εγκεφάλου που προκαλείται από συζημία μεταξύ αμμωνία)

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ.: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Fluorouracil/Opus

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση και στο κουτί μετά τη λέξη «ΛΗΞΗ».

Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Μη ψύχετε ή καταψύχετε.

Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένη ποσότητα.

Διάρκεια ζωής μετά από άραιωση:

Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει επιδειχθεί για 24 ώρες στους 25°C με γλυκόζη 5%, χλωριούχο νάτριο 0,9%,η ύδαιχ;ρια ενόημα σε συγκέντρωση 0,98 mg/ml φθοριουρακίλης. Παρόλ αυτ, από μικροβιολογικής

απόψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες σε θερμοκρασία 2 - 8°C, εκτός εάν η αραίωση πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενες και επικυρωμένα συνθήκες. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, εάν έχει καφετιά ή σκούρα κίτρινη εμφάνιση σε διάλυμα.

Μην το χρησιμοποιήσετε, εάν παρατηρήσετε ότι ο περιέκτης έχει υποστεί φθορά ή υπάρχουν ορατά σωματίδια/κρύσταλλοι.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε το φάρμακο που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Fluorouracil/Opus
- Η δραστική ουσία στο Fluorouracil/Opus είναι η φθοριουρακίλη.
- Το άλλα συστατικά είναι ύδωρ για ενέσιμα, υδροξείδιο του νατρίου και υδροχλωρικό οξύ.

Εμφάνιση του Fluorouracil/Opus και περιεχόμενο της συσκευασίας

1 ml διαλύματος περιέχει 50 mg φθοριουρακίλης **(ως άλας νατρίου που σχηματίζεται in situ).**

Το Fluorouracil/Opus διάλυμα για ένεση ή έγχυση είναι ένα διαυγές, σχεδόν άχρωμο διάλυμα που παρέχεται σε γυάλινα φιαλίδια Ph.Eur τύπου Ι με ελαστικό πώμα.

Κάθε φιαλίδιο των 100 ml περιέχει 5 g φθοριουρακίλης.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
OPUS MATERIA LTD
Παλαιόκαστρο 33
Παλαιό Φάληρο 175 64, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 9408420
Fax: +30 210 9412333
E-mail: info@opusmateria.gr

Παραγωγός
LABORATORI FUNDACIÓ DAU
C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca
08040 Βαρκελώνη, Ισπανία
Τηλ: +34 933 000 858
Fax: +34 933 000 812
E-mail: info@laboratoridau.com

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Ελλάδα	Fluorouracil/Opus
Πορτογαλία	Fluorouracil Opus

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά: 3-8-2018

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ/ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ ΦΘΟΡΙΟΟΥΡΑΚΙΛΗΣ

Οδηγίες χειρισμού κυτταροτοξικών

Η φθοριουρακίλη θα πρέπει να χορηγείται μόνο από ειδικευμένο γιατρό ή υπό την επίβλεψη ειδικευμένου γιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το Fluorouracil/Opus θα πρέπει να προετοιμάζεται για χορήγηση μόνο από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση του παρασκευάσματος. Η προετοιμασία πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ασηπτικό θάλαμο ή σε δομμάτιο που προορίζεται για τη σύνθεση κυτταροτοξικών.

Σε περίπτωση διαρροής, οι χειριστές θα πρέπει να φορέσουν γάντια, μάσκα προσώπου, μέσα προστασίας των οφθαλμών και ποδιά μίας χρήσεως και να ορογήσουν το χαμένο υλικό με απορροφητικό υλικό που διατηρείται στην περιοχή για αυτόν τον σκοπό. Η περιοχή θα πρέπει κατόπιν να καθαριστεί, και όλα τα μολυσμένα υλικά να μεταφερθούν σε ένα σάκο ή δοχείο απόβρηξης υλικού από διαφορά κυτταροτοξικών, και για αργκαστούν με αποτέφρωση.

Μόλυνση

Η φλεβογονορραφία είναι ερεθιστική, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τη μάτια, η προσβεβλημένη περιοχή θα πρέπει να πλένεται με άφθονο νερό ή φυσιολογικό ορό. Για την αντιμετώπιση του παρόδιού αισθήματος νυγμού στο δέρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κρέμα υδροκορτιζόνης 1%. Εάν επιχειρηστούν οι οφθαλμοί ή εάν το παρασκεύασμα εισπνεύστεί ή καταποθεί πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή.

Πρώτες βοήθειες

Επαφή με τα μάτια: Σκαλύνετε αμέσως με νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό, και αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Εισπνοή, κατάποση: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Απόρριψη

Σύριγγες, πιρικτέτες, απορροφητικά υλικά, διάλυμα και οποιοδήποτε άλλο μολυσμένο υλικό θα πρέπει να τοποθετούνται σε ηχρή πλαστική τσάντα ή άλλο αδιαπέραστο υλικό, να επσημαίνονται ως κυτταροτοξικό απόβλητο και να αποτεφρώνονται στους 700°C τουλάχιστον.

Χημική οξυρονοποίηση